

VISO ŽARNYNO PLOVIMAS

Gydymo metodas	Viso žarnyno plovimas (VŽP)
Metodika	Pro zondą į skrandį pilant didelius (paaugliams ir suaugusiesiems iki 2000 ml/val., iš viso nuo 5 iki 50 litrų) osmosiškai suderinto polietilenglikolio ir elektrolitų tirpalo kiekius, sukeliamas tuštinimasis skystos konsistencijos išmatomis ir išplaunamas žarnynas. VŽP galima nutraukti, kai iš tiesiosios žarnos teka švarus skystis
Indikacijos	Nėra aiškios, VŽP galima taikyti, kai reikia šalinti: <ul style="list-style-type: none"> • ilgo veikimo vaistus arba jų kapsulines formas, • geležies preparatus, • nuodus, kurių nejudina aktyvintoji anglis, • narkotikų paketus arba farmakobezoarus
Kontraindikacijos	<ul style="list-style-type: none"> • Skrandžio arba žarnų perforacija, žarnų nepraeinamumas • Kliniškai ryškus kraujavimas į virškinamąjį kanalą • Nestabili hemodinamika • Pasikartojantis nekontroliuojamas vėmimas • Sąmonės sutrikimai arba, kai nėra apsauginių kvėpavimo takų refleksų, o pacientas neintubuotas
Komplikacijos	<ul style="list-style-type: none"> • Pykinimas, vėmimas, pilvo skausmai ir pūtimas • Galima aspiracija
Pastabos	Tiksliai suformuluotų VŽP indikacijų nėra, metodo tinkamumas apsinuodijimams gydyti yra teorinis, o pats metodas mūsų sąlygomis – gana brangus